

Escala internacional de símptomes prostàtics IPSS)

Qüestionari IPSS	Cap	Menys d'una vegada cada 5 vegades	Menys de la meitat de les vegades	Aprox. la meitat de les vegades	Més de la meitat de les vegades	Gairebé sempre	
1. Durant més o menys els últims 30 dies, quantes vegades ha tingut la sensació de no buidar completament la bufeta en acabar d'orinar?	0	1	2	3	4	5	
2. Durant més o menys els últims 30 dies, quantes vegades ha hagut de tornar a orinar a les dues hores següents després d'haver orinat?	0	1	2	3	4	5	
3. Durant més o menys els últims 30 dies, quantes vegades ha notat que, en orinar, parava i començava de nou diverses vegades?	0	1	2	3	4	5	
4. Durant més o menys els últims 30 dies, quantes vegades ha tingut dificultat per a aguantar-se les ganes d'orinar?	0	1	2	3	4	5	
5. Durant més o menys els últims 30 dies, quantes vegades ha observat que el flux d'urina és poc fort?	0	1	2	3	4	5	
6. Durant més o menys els últims 30 dies, quantes vegades ha hagut de prémer o fer força per començar a orinar?	0	1	2	3	4	5	
	Cap	1 vegada	2 vegades	3 vegades	4 vegades	5 o més	
7. Durant més o menys els últims 30 dies, quantes vegades sol haver d'aixecar-se per orinar des que se'n va al llit a la nit fins que s'aixeca al matí?	0	1	2	3	4	5	
	Encantat	Molt satisfet	Més aviat satisfet	Tan satisfet com insatisfet	Més aviat insatisfet	Molt insatisfet	Fatal
8. Com es sentiria si hagués de passar la resta de la vida amb els símptomes prostàtics tal i com els té ara?	0	1	2	3	4	5	6